

◎登園届けが必要な病気
(流行期は意見書が必要になります。)

病名	主な症状	登園の目安	潜伏期間	侵入経路
RSウイルス	発熱、鼻水、せき、喘鳴などにより、呼吸困難を引き起こす。	重篤な呼吸器症状が消え、全身状態が良いこと。	4～6日	飛沫接触
マイコプラズマ肺炎	せき、頭痛、発熱などの風症状がゆっくりと進行し、特にせきは徐々に激しくなる。	発熱や激しいせきが治まって、全身状態が良いこと。	2～3週間	飛沫
伝染性紅斑(リンゴ病)	軽い風症状を示し、頬が赤くなったり手足に網目状の紅斑が出現する。	全身状態が良いこと。	4～14日	飛沫
手足口病	軽い発熱(2～3日) 小さな水疱が口の中、手足にできる。	発熱がなく、普段の食事ができること	3～6日	飛沫 経口 接触
ヘルパンギーナ	突然の高熱(1～3日)。全身がだるく食欲がない。のどちんこや扁桃のまわりに水泡ができるため痛み、そのため食欲がなくなる。	発熱がなく(解熱後1日以上経過)、全身状態が良いこと。普段の食事ができること。	3～6日	飛沫 経口 接触
突発性発疹	38℃以上の高熱が3～4日続いた後、解熱とともに体幹部を中心に鮮紅色の発疹が出現する。軟便になることがある。	解熱後1日以上経過し、全身状態が良いこと。	約10日	飛沫 経口 接触
帯状疱疹	小さい水疱が神経に沿って片側に現れる。	すべての発疹が痂皮化するまで。	不定	接触
単純ヘルペス感染症	歯肉口内炎、口周囲の水疱。歯肉が腫れ、出血しやすく、口内痛も強い。	発熱がなく、普段の食事ができることよだれが止まり、普段の食事ができること。	2日～2週間	接触
とびひ(伝染性膿痂疹)	顔や手に米粒～豆粒大の水疱 → 破れて膿が出る かゆみ	浸出液が出ている間は感染予防のためガーゼをあてる。	2～10日	接触

◎その他

アタマジラミ	かゆい。(少数のときは、かゆみを訴えないこともある) 頭髪について血を吸う。成虫は2～4ミリ、灰白色または少し黒っぽい。血を吸うと赤黒くみえる。少数の場合は卵を探して取り除く。(短毛が良い) 早期治療が必要である。シラミ駆除剤が必要で寝具などは干す。(シーツは毎日洗う)			
水いぼ	わきの下やわき腹などに光沢をおびた粟粒大のいぼ。	水いぼがあれば、プールへの入水は不可。	—	接触